

主治医氏名		印
主治医以外の担当者氏名	担当医師	
	看護師長	
	担当看護師	
	管理栄養士	

病名	
症状	
手術	(あり)
特別な栄養管理の必要性	(あり・なし)

患者番号 0008985093
年 月 日
【患者または代理人同意署名】

入院治療の目標(達成目標) 退院後の生活の注意事項が理解できる。 *代理署名の場合 患者との続柄 ()

推定入院期間	入院日(月日)	手術当日(月日)		手術後1日目~3日目	手術後4~6日目頃(退院日)
		手術前	手術中・手術後		
注射・内服	<ul style="list-style-type: none"> 点滴はありません。 現在内服中の薬をお知らせ下さい。 入院中は医師から指示された薬以外は、内服しないでください。 	<ul style="list-style-type: none"> 午前中から点滴が始まります。 内服は継続しますが、治療にともなう中止薬がある場合は、看護師が説明をします。 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴の部位が腫れたり、痛みがあった時には教えてください。 点滴は手術翌日に終了する予定ですが、採血結果によって続く場合があります。 	<ul style="list-style-type: none"> 内服は通常通りです。 	
検査	<ul style="list-style-type: none"> 外来で検査ができない場合、入院後に検査(レントゲン・心電図・採血・尿検査)をすることがあります。 超音波検査を行い、治療する病変を確認します。 	なし	なし	<ul style="list-style-type: none"> 手術翌日、術後3日目、術後5日目の午前中に採血があります。 	
処置	なし	<ul style="list-style-type: none"> 手術室または処置室までは、徒歩か車椅子で移動します。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術中は仰向けになり、両手を頭の上に持っていきます。手術の姿勢は左向きや座るなど、その都度声を掛けて整えます。局所麻酔で行うので会話はできません。針を身体に刺す時には声を掛けます。 痛み止めの薬で、呼吸が浅くなり酸素が取り入れられないことがあるため、心電図モニターと酸素チューブを装着します。 手術後は、ベッドで病室に戻ります。痛み止めは、手術後に病室で外します。 手術後1時間は心電図モニター装着、安静解除まで酸素チューブを装着します。 	なし	
教育・説明・指導	<ul style="list-style-type: none"> 医師から手術内容について説明があります。 看護師より、治療スケジュールや手術後の注意点(安静度・食事)についての説明をします。 麻酔科の先生と共に、痛み止めの説明をします。 爪にマニキュアをしている場合は、落としてください。 夜眠れないようでしたら、看護師に相談してください。 T字帯を購入してください。 	<ul style="list-style-type: none"> 義歯、貴金属、湿布、ヘアピン、腹巻き等外せる物は全て外して下さい。 耳が聞こえづらい方は、補聴器を付けて入室できます。 目が見えづらい方は、眼鏡をかけて入室できます。 顔色を見るため、化粧はしないでください。 また、髪が長い方はゴムで左右どちらかにまとめてください。 手術に呼ばれたら、T字帯を着用し、肌着は身に着けずに手術着に着替えます。 ご家族は手術1時間前までに来院いただき、手術中は病棟のデイルームでお待ちください。病棟を離れる場合は看護師にお知らせください。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術開始とともに、点滴から痛み止めのお薬が入ります。 痛みが強くなりそうな時、痛い時には痛み止めのボタンを「ピー」と鳴るまで押してください。 手術後は、複数回検温や針を刺した所の観察をします。 異常の早期発見のため、針を刺したところの出血や痛み、腫れなどの症状、貧血症状(めまい、ふらつき、息切れ、動悸)、腹痛など気分が悪い時は看護師に知らせてください。 痛みや吐き気など気分が悪い時には、我慢せずに教えてください。 	<ul style="list-style-type: none"> 針を刺したところの出血や痛み、腫れなどの症状、貧血症状(めまい、ふらつき、息切れ、動悸)、腹痛など気分が悪い時は看護師に知らせてください。 	<ul style="list-style-type: none"> 次回の外来受診について説明をします。 退院後の生活上の注意点について、別紙を用いて説明します。 
安静度	<ul style="list-style-type: none"> 病院内は自由です。 	<ul style="list-style-type: none"> 治療前なので、病棟内にいてください。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術後は5時間仰向けで安静となります。 5時間後、医師が超音波で診察し出血がなければ安静解除となり、トイレまで歩行できます。 医師の指示があるまでは、自分で起きないようにしてください。 	<ul style="list-style-type: none"> 病院内は自由です。 	
食事	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません。(治療食の場合があります。) 	<ul style="list-style-type: none"> 飲水は12時まで可能です。 朝と昼の食事はできません。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術後5時間までは食事や飲水はできません。 夕食または安静解除後より食事開始となります。 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません。(治療食の場合があります。) 	
排泄	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません。 	<ul style="list-style-type: none"> 尿の管を入れます。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術中は尿の管で対応します。 手術後、排便時はベッド上で差し込み便器を使用します。 手術後5時間経ったら尿の管を抜き、トイレまで歩行できます。 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません。 	
清潔	<ul style="list-style-type: none"> シャワーに入れます。 	<ul style="list-style-type: none"> シャワーは入れません。 		<ul style="list-style-type: none"> 治療翌日は清拭を行い、治療2日目からシャワーに入れます。 	
リハビリ	なし	なし	なし	なし	なし
その他	なし	なし	なし	なし	なし

*病名等は、現時点で考えられるものとなりますので、今後検査を進めていくうえで変更される可能性があります。
 *入院期間については、現時点での予想となっており、状態に応じ予定が異なることも考えられます。
 *何か質問がある際は医療者にお尋ね下さい。