

各位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

## D I ・ B O X # 0 2 6 3

## 「プラビックス錠」の急性冠症候群の適応追加について

抗血小板剤「プラビックス錠 25mg、75mg」（サノフィアベンティス）は、10月19日付で適応症に「経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される急性冠症候群（不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞）」が追加されました。

追加された内容は以下のとおりです。

薬品名	プラビックス錠 25mg	プラビックス錠 75mg
		
成分名 規格	硫酸クロピドグレル 25mg／錠	硫酸クロピドグレル 75mg／錠
適応症 用法用量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>経皮的冠動脈形成術（PCI）が適用される急性冠症候群（不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞） ←適応追加</b> 成人投与開始日に 300mg を 1日1回服用し、その後維持量として1日1回 75mg を服用</li> <li>・ 虚血性脳血管障害（心原性脳塞栓症を除く）後の再発抑制 成人 75mg を 1日1回服用、年齢・体重・症状により 50mg を 1日1回服用</li> </ul>	
使用上の注意 （今回の適応追加に関連する部分のみ記載）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>アスピリン（81～100mg／日）と併用すること</b></li> <li>・ PCIが適用予定の急性冠症候群（不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞）患者への投与は可能である。冠動脈造影により、保存的治療あるいは冠動脈バイパス術が選択され、PCIを適用しない場合には、以後の投与は控えること。</li> <li>・ 急性冠症候群（不安定狭心症、非ST上昇心筋梗塞）を対象として本剤を適用するにあたっては、ローディングドーズ投与（投与開始日に 300mg を服用すること）およびアスピリンとの併用によって出血のリスクが高まる可能性があることを十分考慮すること。</li> </ul>	
オーダ	入院・院内・院外	入院・院内・院外

\* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

\* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。