

各位

薬剤部／薬品情報室（DI室）

## DI・BOX#0292

## 「トレドミン錠」の用法・用量変更について

セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤（SNRI）「**トレドミン錠 15mg、25mg**」（旭化成ファーマ）は、**再審査の結果、用法・用量が一部変更になりました。**

初期用量 50mg/日と 25mg/日の比較試験で、有用性に差はなかったものの、25mg/日から開始した患者の方が副作用が少なかったことから**初期用量が 25mg/日へ変更となりました。**

なお、本剤は湿気に弱く粉砕後の安定性が悪いため、粉砕オーダはできません。

変更された内容は以下のとおりです。

薬品名	トレドミン錠 15mg 	トレドミン錠 25mg 
成分名 規格	塩酸ミルナシプラン 15mg/錠	塩酸ミルナシプラン 25mg/錠
適応症	うつ病・うつ状態	
用法用量 変更前	成人 1日 50mg を初期用量とし、1日 100mg まで漸増し、食後、分割服用 なお、年齢、症状により適宜増減 ただし、高齢者には、1日 30mg を初期用量とし、1日 60mg まで漸増し、食後、分割服用	
<b>変更後</b>	成人 <b>1日 25mg を初期用量</b> とし、1日 100mg まで漸増し、 <b>1日 2～3回に分けて食後に服用</b> なお、年齢、症状により適宜増減 ただし、高齢者には、 <b>1日 25mg を初期用量</b> とし、1日 60mg まで漸増し、 <b>1日 2～3回に分けて食後に服用</b>	
オーダ	入院・院内・院外	

**\*赤字が変更部分**

\*詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

\*「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。