

2009年10月16日

各位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ B O X # 0 3 8 9

## 「クラビット錠、クラビット細粒」の用法用量の変更について

ニューキノロン系抗菌薬「クラビット錠」「クラビット細粒」（第一三共）は、より高い治療効果と耐性化の抑制が得られることから、**用法が1日3回から1日1回へ変更となります。**

これにより、**平成21年10月21日（水）から1日1回投与製剤（250mg錠、500mg、250mg/包細粒）のオーダーを開始し、1日3回投与製剤（100mg錠、細粒）の取扱いを中止とします。**1日3回投与製剤は院外の取扱いも中止となります。

なお、1日1回投与製剤は1日3回投与製剤と1回投与量が異なります。下表を参考にオーダーの際は十分注意して下さい。

|           | 新採用<br>(1日1回投与)  | 取扱い中止<br>(1日3回投与)  |
|-----------|--|--|
| 薬品名       | クラビット錠 250mg<br>クラビット錠 500mg<br>クラビット細粒 250mg/包  | クラビット錠 100mg<br>クラビット細粒 100mg/g  |
| 成分名<br>規格 | レボフロキサシン<br>250mg/錠、500mg/錠、250mg/包  | レボフロキサシン水和物<br>100mg/錠、100mg/g   |
| 用法用量      | ・成人1回 <b>500mg</b> を1日1回服用<br>疾患・症状に応じて適宜減量<br>腎機能低下患者では、腎機能に応じ以下のとおり投与する<br>20≤Ccr<50：初日500mgを1回<br><b>2日目以降250mg</b> を1日に <b>1回</b> 投与<br>Ccr<20：初日500mgを1回<br><b>3日目以降250mg</b> を2日に <b>1回</b> 投与 | ・成人1回100mgを1日2～3回服用<br>疾患・症状に応じて適宜増減<br>重症または効果不十分例は1回200mgを1日3回服用                   |
| 製剤写真      |   |  |
| オーダー      | 処方（入院・外来院内・外来院外）<br><b>10/21（水）からオーダー開始</b>  | 処方（入院・外来院内・外来院外）<br><b>10/20（火）で取扱い中止</b>  |