

2009年12月25日

各位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

## D I ・ B O X # 0 4 0 0 （緊急副作用情報）

### 「バクタ配合錠」による好中球減少について

バクタ配合錠（塩野義）による好中球減少は、添付文書にも頻度不明で記載されていますが、その発生頻度は低い（2004年に1例報告、2008年に1例報告、今年報告なし）とされています。しかし、この1ヶ月間に当院で処方された配合バクタ錠を服用した患者において、重篤な好中球減少（0.04～0.07）が3例つづけて発生しました。


製薬企業に最近の好中球減少症の報告状況について調査依頼したところ、企業からは「このように短期間に同一施設より重篤な好中球減少が報告されたことはない、引き続き最近の報告状況について調査する」と回答されています。

詳細が判明するまで下記の点に留意されるようお願いいたします。

- ・ バクタ処方患者においては好中球減少症の発現に十分注意してください。
- ・ バクタ服用患者に咳や発熱が認められた場合には好中球減少症を疑ってください。
- ・ 好中球減少など副作用が認められた場合には、薬剤部（3194または3196）までご連絡ください。

今回の好中球減少症が特定のロットに発生している可能性もあることから、当院では3人の患者が服用したと考えられるバクタ配合錠のロットを特定し、該当ロットが調剤された可能性のある患者を特定しております。

患者が特定できしだい処方医師にご連絡いたしますので臨床検査の実施を含めご協力をお願いいたします。

薬品名	バクタ配合錠	
成分名 規格	1錠中 ルファメトキサゾール 400mg トリメトプリム 80mg	
適応症 用法用量	・肺炎、慢性呼吸器病変の二次感染 ・複雑性膀胱炎、腎盂腎炎 ・感染性腸炎、腸チフス、パラチフス 成人1日4錠を2回に分け服用、年齢・症状に応じて適宜増減	
採用区分・オーダ	入院・外来院内・外来院外	

\* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。