

各位

薬剤部／薬品情報室（DI室）

DI・BOX#0429

「ムコダイン DS」の含有量変更について

「ムコダイン DS33.3%」（杏林）は、**主成分である L-カルボシステインの含量が 333.33mg/g から 500mg/g へ変更となり、見かけ上のかさが減ります。**

また、剤形、味、においに変更はありませんが、**色調が微赤白色～淡赤白色から白色に変更となります。**

平成 22 年 6 月 11 日（金）より、「ムコダイン DS50%（500mg/g）」のオーダを開始し、「ムコダイン DS33.3%（333.3mg/g）」のオーダを中止します。

従来より使用している患者での**本剤の DO 処方**は、**初回に限りできません**ので注意してください。

なお、**含有量が異なるため、「g（製剂量）」でオーダする際は注意してください。**

	新名称	旧名称
オーダ名	ムコダイン DS50%（500mg/g）	ムコダイン DS33.3%（333.3mg/g）
成分名 規格	L-カルボシステイン 500mg/g	L-カルボシステイン 333.33mg/g
適応症	<ul style="list-style-type: none"> 右記疾患の去痰：上気道炎（咽頭炎、喉頭炎）、急性気管支炎、気管支喘息、慢性気管支炎、気管支拡張症、肺結核 慢性副鼻腔炎の排膿 滲出性中耳炎の排液（小児適応のみ） 	
用法用量	成人：1回500mgを用時懸濁し、1日3回経口投与。年齢、症状により適宜増減 小児：体重kg当たり1回10mgを用時懸濁し、1日3回経口投与 年齢、症状により適宜増減	
外観写真	 白色	 微赤白色～淡赤白色
オーダ 採用区分	処方／共通 平成 22 年 6 月 11 日（金）よりオーダ開始	処方／共通 平成 22 年 6 月 11 日（金）より取扱い中止

* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。