

各位

薬剤部／薬品情報室（D I室）



D I・BOX#0553

「ジルテック錠 10mg」の院内採用中止および 「ザイザル錠 5mg」の入院・外来院内オーダ開始について

現在、院外専用薬品として採用されている、持続性選択H₁受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤「ザイザル錠 5mg」（グラクソ・スミスクライン）は、薬事委員会にて「ジルテック錠 10mg」（グラクソ・スミスクライン）と交換採用になりました。

平成23年8月6日（土）より「ザイザル錠 5mg」の入院・外来院内でのオーダを開始し、「ジルテック錠 10mg」を院外専用薬品とします。

なお、「ザイザル錠 5mg」、「ジルテック錠 10mg」は引き続き院外処方可能です。「ザイザル錠 5mg」を従来より使用している患者での本剤のDO処方は、初回に限りできませんので注意してください。

| | 共通採用へ | 院外専用薬品へ |
|-------------|--|---|
| 薬品名 | ザイザル錠 5mg | ジルテック錠 10mg |
| 成分名 規格 | レボセチリジン塩酸塩（R-エナンチオマー） 5mg／錠 | セチリジン塩酸塩（ラセミ体） 10mg／錠 |
| 適応症 用法用量 | <u>〔成人〕アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症：成人には1回5mgを1日1回、就寝前に経口投与。年齢、症状により適宜増減、最高投与量は1日10mg</u> <u>〔小児〕アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒：7歳以上15歳未満の小児には1回2.5mgを1日2回、朝食後及び就寝前に経口投与</u> | <u>〔成人〕アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、痒疹、皮膚そう痒症：成人には1回10mgを1日1回、就寝前に経口投与。年齢、症状により適宜増減、最高投与量は1日20mg</u> <u>〔小児〕アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒：7歳以上15歳未満の小児には1回5mgを1日2回、朝食後及び就寝前に経口投与</u> |
| 外観写真 |  |  |
| 採用区分 オーダ | 共通／共通 平成23年8月6日（土）から共通採用へ | 処方／院外 平成23年8月6日（土）から院外専用薬品へ |

* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。