

2012年11月8日

各位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

DI・BOX#0670

『ファモチジン D 錠 10mg 「EMEC」』のオーダ開始について

H₂受容体拮抗剤『ファモチジン D 錠 10mg 「EMEC」』（エルメッドエーザイ）は、薬事委員会にて現在採用の「ガスターD 錠 10mg」（アステラス）と交換採用になりました。

平成 24 年 11 月 9 日（金）より『ファモチジン D 錠 10mg 「EMEC」』のオーダを開始し、「ガスターD 錠 10mg」は薬剤部の在庫がなくなり次第、院内での取り扱いを中止します。

「ガスターD 錠 10mg」は引き続き院外処方可能です。また、「ガスター注射液 20mg」は引き続き注射オーダ可能です。

	後発医薬品	先発医薬品
オーダ名	ファモチジン D 錠 10mg 「EMEC」	ガスターD 錠 10mg
成分名、規格	ファモチジン、10mg／錠	
適応症	・胃潰瘍、十二指腸潰瘍、吻合部潰瘍、上部消化管出血（消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による）、逆流性食道炎、Zollinger-Ellison 症候群：成人には 1 回 20mg を 1 日 2 回（朝食後、夕食後または就寝前）経口投与。また、1 回 40mg を 1 日 1 回（就寝前）経口投与可。年齢・症状により適宜増減。上部消化管出血の場合には通常注射剤で治療を開始し、内服可能になった後は経口投与に切りかえる。 ・急性胃炎、慢性胃炎の急性増悪期の胃粘膜病変（びらん、出血、発赤、浮腫）の改善：成人には 1 回 10mg を 1 日 2 回（朝食後、夕食後または就寝前）経口投与。また、1 回 20mg を 1 日 1 回（就寝前）経口投与可。年齢・症状により適宜増減。	
外観写真		
採用区分	処方／共通 平成 24 年 11 月 9 日（金）より オーダ開始	処方／院外 薬剤部の在庫がなくなり次第、 院外専用薬品へ

* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。