

2013年3月15日

各位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ B O X # 0 6 8 8

『テイコプラニン点滴静注用 200mg 「トーフ」』の オーダ開始について

グリコペプチド系抗生物質製剤『テイコプラニン点滴静注用 200mg 「トーフ」』（東和薬品）は、薬事委員会にて現在採用の「注射用タゴシッド 200mg」（サノフィ）と交換採用になりました。

平成 25 年 3 月 15 日（金）より『テイコプラニン点滴静注用 200mg 「トーフ」』のオーダを開始し、「注射用タゴシッド 200mg」のオーダを中止します。

	後発医薬品	先発医薬品
オーダ名	テイコプラニン点滴静注用 200mg 「トーフ」	タゴシッド注射用 200mgV
成分名、規格	テイコプラニン、200mg／バイアル	
適応症 用法・用量	[適応菌種] 本剤に感性のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA） [適応症] 敗血症、深在性皮膚感染症、慢性膿皮症、外傷・熱傷及び手術創等の二次感染、肺炎、膿胸、慢性呼吸器病変の二次感染 成人：初日 400mg 又は 800mg を 2 回に分け、以後 1 日 1 回 200mg 又は 400mg を 30 分以上かけて点滴静注。敗血症には、初日 800mg を 2 回に分け、以後 1 日 1 回 400mg を 30 分以上かけて点滴静注 乳児、幼児又は小児：10mg/kg を 12 時間間隔で 3 回、以後 6～10mg/kg（敗血症などの重症感染症では 10mg/kg）を 24 時間ごとに 30 分以上かけて点滴静注 新生児（低出生体重児を含む）：初回のみ 16mg/kg を、以後 8mg/kg を 24 時間ごとに 30 分以上かけて点滴静注 年齢、体重、症状により適宜増減	
外観写真		
採用区分	注射 平成 25 年 3 月 15 日（金）より オーダ開始	注射 平成 25 年 3 月 15 日（金）より オーダ中止

* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。