

2013年6月5日

各 位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 0 6 9 8

## 「ナウゼリンOD錠10mg」のオーダ開始について

消化管運動改善剤「ナウゼリン錠10mg」（協和発酵キリン）は、薬事委員会にて、**口腔内崩壊錠である「ナウゼリンOD錠10mg」（協和発酵キリン）と交換採用になりました。**

**平成25年6月7日（金）より「ナウゼリンOD錠10mg」のオーダを開始し、「ナウゼリン錠10mg」は、院外専用薬品とします。**従来より使用している患者での本剤のDO処方は、初回に限りできませんので注意して下さい。

	オーダ開始	院外専用へ
オーダ名	<b>ナウゼリンOD錠10mg</b>	<b>ナウゼリン錠10mg</b>
成分名、規格	ドンペリドン、10mg／錠	
適応症 用法用量	下記疾患および薬剤投与時の消化器症状（悪心、嘔吐、食欲不振、腹部膨満、上腹部不快感、腹痛、胸やけ、あい気） 〔成人〕慢性胃炎、胃下垂症、胃切除後症候群 抗悪性腫瘍剤またはレボドパ製剤投与時 ：1回10mgを1日3回食前に経口投与。レボドパ製剤投与時には1回5～10mgを1日3回 <b>食前</b> に経口投与。年齢、症状により適宜増減 〔小児〕周期性嘔吐症、上気道感染症 抗悪性腫瘍剤投与時 ：1日1.0～2.0mg/kgを1日3回 <b>食前</b> に分けて経口投与。年齢、体重、症状により適宜増減 1日投与量は30mgを超えない。6才以上の場合は1日最高用量は1.0mg/kgを限度	
外観写真		
区分	処方／共通 <b>平成25年6月7日（金）より 入院・外来（院内・院外）オーダ開始</b>	処方／院外 <b>平成25年6月7日（金）より 院外専用薬品へ</b>

\*詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

\*「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。