

2014年8月29日

各 位


薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 0 7 6 8

## 「ヒシダリン注0.5mg」の販売名変更について

遷延性意識障害治療剤／脊髄小脳変性症治療剤「ヒシダリン注0.5mg」（ニプロ）は、販売名が『プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」』へ変更となりました。なお、適応症、用法・用量に変更はありません。

平成26年8月29日（金）より『プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」』のオーダーを開始し、「ヒシダリン注0.5mg」のオーダーを中止します。

|              | 新名称   | 旧名称  |
|--------------|---|--|
| オーダー名        | プロチレリン酒石酸塩注<br>0.5mg「NP」1mLA  | ヒシダリン注0.5mg/1mLA   |
| 成分名、規格       | プロチレリン酒石酸塩、0.5mg/1mL/アンプル   |  |
| 適応症<br>用法・用量 | <ul style="list-style-type: none"><li>・<u>遷延性意識障害（ただし、昏睡、半昏睡を除く）</u>：成人には疾患に応じて、下記の用量を1日1回10日間静注又は点滴静注<ol style="list-style-type: none"><li>1) <u>頭部外傷</u>：1回0.5～2mg</li><li>2) <u>くも膜下出血（ただし、意識障害固定期間3週以内）</u>：1回2mg</li></ol></li><li>・<u>脊髄小脳変性症における運動失調の改善</u>：成人には1日1回0.5～2mgを筋注又は静注するが、重症例には2mgを注射。2～3週間連日注射した後、2～3週間の休薬期間をおく。以後、これを反復するか、週2～3回の間歇注射を行う</li></ul> 静注の場合、生食、ブドウ糖液又は注射用水5～10mLに希釈して、徐々に注射 |  |
| 外観写真         |    |  |
| 区分           | 注射<br>平成26年8月29日（金）よりオーダー開始   | 注射<br>平成26年8月29日（金）よりオーダー中止  |

\* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

\* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。