

2015年4月3日

各 位



薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 0 7 9 8

## 「サークレス注0.05%（5mg）」の販売名変更について

冠血管拡張剤「サークレス注0.05%（5mg）」（高田製薬）は、販売名が『硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」』へ変更となりました。なお、適応症、用法・用量に変更はありません。

平成27年4月4日（土）より『硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」』のオーダーを開始し、「サークレス注0.05%（5mg）」のオーダーを中止します。

|              | 新名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 旧名称                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| オーダー名        | 硝酸イソソルビド注5mg/10mL<br>「タカタ」                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | サークレス注0.05%5mg/10mLA                                                                 |
| 成分名、規格       | 硝酸イソソルビド、5mg/10mL/アンプル                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |
| 適応症<br>用法・用量 | 1.急性心不全（慢性心不全の急性増悪期を含む）：成人には、本剤をそのまま、又は生食、5%ブドウ糖液等で希釈して0.05～0.001%溶液とし、1時間あたり1.5～8mgを点滴静注。投与量は、患者の病態に応じて適宜増減、増量は1時間あたり10mgまで<br>2.不安定狭心症：成人には、本剤をそのまま、又は生食、5%ブドウ糖液等で希釈して0.05～0.001%溶液とし、1時間あたり2～5mgを点滴静注。投与量は患者の病態に応じて適宜増減<br>3.冠動脈造影時の冠攣縮寛解：成人には、冠動脈造影時に本剤をそのまま、5mgをカテーテルを通し、バルサルバ洞内に1分以内に注入。投与量は患者の症状に応じて適宜増減、投与量の上限は10mgまで |                                                                                      |
| 外観写真         |                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 区分           | 注射<br>平成27年4月4日（土）よりオーダー開始                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 注射<br>平成27年4月4日（土）よりオーダー中止                                                           |

\* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

\* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。