

2017年2月27日

各 位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 0 9 3 1

## 「ベナ錠10mg」の販売中止について

院内専用医薬品である抗ヒスタミン剤「ベナ錠10mg」（佐藤製薬）は、販売中止となりました。**平成29年2月27日（月）より「ベナ錠10mg」の当院取扱いを中止し、オーダーを中止します。（院外処方も不可）**

「ベナ錠」の同効薬である第1世代抗ヒスタミン剤（共通採用のみ）は、下記を参照してください。

薬品名（成分名）	規格	適応症、用法・用量	区分
ベナ錠 (ジフェヒドラミン)	10mg／錠	・ 蕁麻疹、皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹、皮膚炎）、枯草熱、アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎、急性鼻炎、春季カタルに伴うそう痒： [成人] 1回30～50mg（3～5錠）を1日2～3回経口投与。 年齢、症状により適宜増減。	販売中止 (院外処方不可)
ポララミン錠 (d-クロルフェニラミン マレイン酸塩)	2mg／錠	・ 蕁麻疹、血管運動性浮腫、枯草熱、皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、薬疹）、アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽： [成人] 1回2mgを1日1～4回経口投与。 年齢、症状により適宜増減。	処方／共通
アタラックス-P カプセル (ヒドロキシジン 塩酸塩)	25mg／ カプセル	・ 蕁麻疹、皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）： [成人] 1日85～128mgを2～3回に分割経口投与。 ・ 神経症における不安・緊張・抑うつ： [成人] 1日128～255mgを3～4回に分割経口投与。 年齢、症状により適宜増減。	
ペリアクチン散 1% (シプロヘパジン 塩酸塩水和物)	10mg／g	・ 皮膚疾患に伴うそう痒（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症、薬疹）、じん麻疹、血管運動性浮腫、枯草熱、アレルギー性鼻炎、血管運動性鼻炎、感冒等上気道炎に伴うくしゃみ・鼻汁・咳嗽： [成人] 1回4mgを1日1～3回経口投与。 年齢、症状により適宜増減。	

\* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

\* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。