

2017年3月10日

各 位



薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 09 3 6

## 『シタラビン点滴静注液400mg、1g「テバ」』の オーダ開始について

再発・難治性急性白血病・悪性リンパ腫治療剤「キロサイドN注400mg、1g」（日本新薬）は、薬事委員会にて、『シタラビン点滴静注液400mg、1g「テバ」』（武田）と交換採用となりました。

**平成29年3月10日（金）より『シタラビン点滴静注液400mg、1g「テバ」』のオーダを開始し、「キロサイドN注400mg、1g」は当院取り扱いを中止します。**

	オーダ開始	オーダ中止
オーダ名	シタラビン点滴静注液400mg、1g「テバ」	キロサイドN注400mg、1g
成分名	シタラビン	
規格	400mg／20mL／バイアル 1g／50mL／バイアル	400mg／20mL／アンプル 1g／50mL／バイアル
適応症 用法用量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シタラビン大量療法 再発又は難治性の下記疾患</li> <li>(1) 急性骨髄性白血病：               <ul style="list-style-type: none"> <li>[成人] 1回2g/m<sup>2</sup>を5%ブドウ糖液あるいは生食に混合して300～500mLとし、12時間毎に3時間かけて点滴で最大6日間連日静注</li> <li>[小児] 1回3g/m<sup>2</sup>を12時間毎に3時間かけて点滴で3日間連日静注</li> </ul> </li> <li>(2) 急性リンパ性白血病：               <ul style="list-style-type: none"> <li>[成人] 他の抗腫瘍剤と併用し、1回2g/m<sup>2</sup>を5%ブドウ糖液あるいは生食に混合して300～500mLとし、12時間毎に3時間かけて点滴で最大6日間連日静注</li> <li>[小児] 他の抗腫瘍剤と併用し、1回2g/m<sup>2</sup>を12時間毎に3時間かけて点滴で3日間連日静注</li> </ul> </li> <li>(3) 悪性リンパ腫：               <ul style="list-style-type: none"> <li>[成人] 他の抗腫瘍剤と併用し、1回2g/m<sup>2</sup>を5%ブドウ糖液あるいは生食に混合して300～500mLとし、1日1～2回3時間かけて点滴で1～2日間（最大2回）連日静注</li> <li>[小児] 他の抗腫瘍剤と併用し、1回2g/m<sup>2</sup>を12時間毎に3時間かけて点滴で3日間連日静注</li> </ul> </li> </ul>	
外観写真		
区分	注射 平成29年3月10日（金）よりオーダ開始 小児科・第2内科・血液腫瘍内科限定	注射 平成29年3月10日（金）より オーダ中止

\* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

\* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。