

2017年3月15日

各 位



薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 0 9 3 9

『ビタミンB6散10%「マルイシ」』のオーダー開始について

ビタミンB6剤『ビタミンB6散「マルイシ」』（丸石製薬）は、薬事委員会にて、「アデロキザール散7.8%」（ゾンネボード製薬）の販売中止に伴い交換採用となりました。

平成29年3月15日（水）より『ビタミンB6散10%』「マルイシ」のオーダーを開始し、「アデロキザール散7.8%」は当院取り扱いを中止（院外処方も不可）します。

	オーダー開始	オーダー中止（販売中止）
オーダー名	ビタミンB6散10%「マルイシ」	アデロキザール散7.8%
成分名	ピリドキシン塩酸塩	ピリドキサルリン酸エステル水和物
規格	100mg/g	78mg/g
適応症 用法用量	<p>1. ビタミンB₆欠乏症の予防及び治療（薬物投与によるものを含む。例えばイソニアジド）</p> <p>2. ビタミンB₆の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦など）</p> <p>3. ビタミンB₆依存症（ビタミンB₆反応性貧血など）</p> <p>4. 下記疾患のうち、ビタミンB₆の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合（効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない）</p> <p>1) 口角炎、口唇炎、舌炎</p> <p>2) 急・慢性湿疹、脂漏性湿疹、接触皮膚炎</p> <p>3) 末梢神経炎</p> <p>4) 放射線障害（宿酔）</p> <p>[成人] 1日10~100mg（本剤：0.1~1g）を経口投与。年齢、症状により適宜増減。きわめてまれであるが、依存症の場合には、より大量を用いる必要のある場合もある。</p>	<p>1. ビタミンB₆欠乏症の予防及び治療（薬物投与によるものを含む。例えばイソニアジド）</p> <p>2. ビタミンB₆の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給（消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等）</p> <p>3. ビタミンB₆依存症（ビタミンB₆反応性貧血等）</p> <p>4. 下記疾患のうちビタミンB₆の欠乏又は代謝障害が関与すると推定される場合（効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない）</p> <p>1) 口角炎、口唇炎、舌炎、口内炎</p> <p>2) 急・慢性湿疹、脂漏性湿疹、接触皮膚炎、アトピー皮膚炎</p> <p>3) 尋常性ざ瘡</p> <p>4) 末梢神経炎</p> <p>5) 放射線障害（宿酔）</p> <p>[成人] 1日10~60mgを1~3回に分割経口投与。年齢、症状により適宜増減。きわめてまれであるが、依存症の場合には、より大量を用いる必要のある場合もある。</p>
外観写真		
区分	処方／共通 平成29年3月15日（水）よりオーダー開始	平成29年3月16日（木）より オーダー中止（販売中止、院外処方も不可）

*詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

*「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。