

2019年4月26日

各 位



薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 1 1 7 8

「サンリズム注射液 50」のオーダ開始について

不整脈治療剤『ピルシカイニド塩酸塩静注 50mg 「YD」』（株式会社陽進堂）の製造中止に伴い、薬事委員会にて先発医薬品である「サンリズム注射液 50」（第一三共株式会社）へ交換採用となりました。

2019年4月27日（土）より「サンリズム注射液50」のオーダを開始し、『ピルシカイニド塩酸塩静注50mg 「YD」』は2019年4月26日（金）より当院取扱いを中止します。

| | オーダ開始 | オーダ中止 |
|-------------|--|--|
| オーダ名 | サンリズム注射液50 | ピルシカイニド塩酸塩静注 50mg 「YD」 |
| 成分名 | ピルシカイニド塩酸塩 | |
| 規格 | 50mg/5mL/アンプル | |
| 適応症 用法用量 | ・ 緊急治療を要する頻脈性不整脈(上室性及び心室性)： 期外収縮：1 回 0.075mL/kg(ピルシカイニド塩酸塩水和物として 0.75mg/kg)を必要に応じて生食又は 5%ブドウ糖液などで希釈し、血圧ならびに心電図監視下に 10 分間で徐々に静注 年齢、症状により適宜増減 頻拍：1 回 0.1mL/kg(ピルシカイニド塩酸塩水和物として 1.0mg/kg)を必要に応じて生食又は 5%ブドウ糖液などで希釈し、血圧ならびに心電図監視下に 10 分間で徐々に静注 年齢、症状により適宜増減 | |
| 外観写真 |  |  |
| 区分 | 注射 2019年4月27日（土）よりオーダ開始 | 注射 2019年4月26日（金）よりオーダ中止 |

* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。