

## 院内製剤の請求について

オーダ:(院内) 処方・注射オーダ入力可能な製剤 院内常用製剤  
オーダ:(処伝) 薬品請求伝票により請求する製剤 院内常用製剤  
オーダ:(製伝) 製剤請求伝票により請求する製剤 院内特殊製剤  
オーダ:(麻伝) 麻薬注射液施用票により請求する製剤 麻薬用製剤

特殊製剤の請求には〔特殊製剤調製依頼書〕または〔製剤請求伝票〕が必要です。使用にあたっては〔院内製剤用同意書〕による同意の取得が必要です。特殊製剤は依頼を受けてから調製を開始します。院内製剤について詳細や不明な点は、薬剤部製剤室(内線:3203)まで問い合わせください。

## 院内製剤

### 1 内服剤

#### A カプセル剤

##### 硫酸亜鉛カプセル

硫酸亜鉛

1カプセル中 硫酸亜鉛・7水和物 100mg(亜鉛として22.7mg)

オーダ:(院内)(リュウサンアエン)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

亜鉛欠乏症:1回22.7mg(1カプセル)1日1～3回食後服用

#### B 液剤

##### 10%内服用ヨウ化カリウム液

ヨウ素

1mL中 100mg 1滴中 5mg

オーダ:(院内)(ヨウカカリウムエキ)

適応症・用法・用量

甲状腺疾患時のヨウ素補給 甲状腺切除術前投与:1日1～3回 適量を希釈して服用

貯法:室温・遮光

甲状腺疾患時のヨウ素補給:1日1～3回 適量を希釈して服用

貯法:室温・遮光

### 2 外用剤

#### A 軟膏剤

##### 0.055%アズレンCMC軟膏(DO-AZ)

グアイアズレン

1g中 0.55mg

オーダ:(院内)(デオウエイゼット/DOAZ)

適応症・用法・用量

口内炎 齧口瘡 舌炎の消炎:1日1～数回 適量を口腔内に塗布

貯法:冷所・遮光

##### 0.5%アネステジンCMC軟膏(DO-Ane)

アミノ安息香酸エチル

1g中 5mg

オーダ:(院内)(デオウエイエヌイ/DOANE)

適応症・用法・用量

口腔内鎮痛:1日1～数回 適量を口腔内に塗布

貯法:冷所・遮光

#### S・P・D軟膏

塩酸ジブカイン プロテイン銀

1g中 塩酸ジブカイン5mg プロテイン銀500mg

オーダ:(院内)(エスピデイ/SPD)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

鼻腔内消炎 鎮痛:1日数回 適量を鼻腔内に塗布

貯法:冷所・遮光

#### FOY軟膏【特殊製剤】

メシル酸ガベキサート

1g中 10mg

オーダ:(院内)(エフォーワイ/FOY)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

膵胆ドレナージ・人工肛門部における消化液の漏出に伴う皮膚の糜爛:

1日数回 適量を糜爛部周辺に塗布

貯法:冷所・遮光

#### カプサイシン軟膏0.075%【特殊製剤】

カプサイシン

1g中 0.75mg

オーダ:(院内)(カプサイシン)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

糖尿病性末梢神経障害 帯状疱疹後疼痛 末梢性神経因性疼痛に伴う

鎮痛:1日数回 適量を疼痛部位に塗布

貯法:冷所・遮光

## 院内製剤

### トレチノイン軟膏0.1%【特殊製剤】

all-trans-レチノイン酸

1g中 1mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

肝斑 雀卵斑 老人性色素斑:1日1～2回 朝 眠前に適量を患部に塗布

貯法:冷所・遮光

### 5%ヒドロキノン・10%アスコルビン酸軟膏【特殊製剤】

ヒドロキノンL - アスコルビン酸リン酸エステルマグネシウム塩n水和物

1g中 ヒドロキノン50mg アスコルビン酸100mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

肝斑 雀卵斑 老人性色素斑:1日1～2回 朝 眠前に適量を患部に塗布

貯法:冷所・遮光

### 5%ヒドロキノン・7%乳酸軟膏【特殊製剤】

ヒドロキノン 乳酸

1g中 ヒドロキノン50mg 乳酸70mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

肝斑 雀卵斑 老人性色素斑:1日1～2回 朝 眠前に適量を患部に塗布

貯法:冷所・遮光

### リドカインゲル【特殊製剤】

塩酸リドカイン

1g中 100mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

伝染性軟属腫の掻爬 疣贅の除去時の表面麻酔:1日1～2回 適量を患部に塗布

貯法:冷所・遮光

### リドメックス・ケラチナミン軟膏

吉草酸酢酸プレドニゾロン 尿素

リドメックス軟膏:ケラチナミン軟膏=1:1

オーダ:(院内)(リドメックスケラチナミン)

適応症・用法・用量

アトピー性皮膚炎:1日1～数回 適量を塗布

貯法:冷所・遮光

## B 液剤

### 安息香酸ベンジル液【特殊製剤】

安息香酸ベンジル

1本(250mL)中 75mL

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

疥癬:用時振盪後 適量を刷毛を用いて塗布

貯法:冷所

### 塩化アルミニウム液20%

塩化アルミニウム

1mL中 200mg

オーダ:(院内)(エンカルミニウムエキ / ALM)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

多汗症 腋臭症:1日数回 適量を清拭

### 硝酸銀液10%

硝酸銀

劇1本 50mL

1mL中 100mg

オーダ:(処伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

止血(鼻出血等)扁桃腺炎 鼻口腔粘膜焼灼:適量を患部に塗布

貯法:室温・遮光

### ピオクタニン液1%

塩化メチルロザニリン

1本 50mL

1mL中 10mg

オーダ:(処伝)

適応症・用法・用量

湿潤性病巣の二次感染予防および乾燥化:1回適量を患部に散布

貯法:室温・遮光

### ポドフィリンアルコール液10%

ポドフィリン

1本 25mL

1mL中 100mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

尖圭コンジローマ:1日1回 適量を患部に塗布

貯法:冷所・遮光

**ヨモギローション【特殊製剤】**

ヨモギ末  
1本 500mL  
1mL中 25mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

黄痘 アトピー性皮膚炎 老人性そう痒症に伴う痒み:1日数回 適量を清拭または散布

**ヨモギローション(20% 尿素含有)【特殊製剤】**

1本 500mL  
ヨモギ末 1mL中 25mg  
尿素 1mL中 200mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

黄痘 アトピー性皮膚炎 老人性そう痒症に伴う痒み:1日数回 適量を清拭または散布

**レバミド含嗽液No 1**

レバミド  
1本 300mL  
1mL中 レバミド1mg  
オーダ:(院内)(レバミド)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

化学療法および放射線療法において発現する口内炎の予防および治療:1回50mL 朝昼夕食後 10時 15時 眠前の1日6回 口腔内うがい

**レバミド含嗽液No 2**

レバミド  
1本 300mL  
1mL中 レバミド1mg 塩酸リドカイン5mg  
オーダ:(院内)(レバミド)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

化学療法および放射線療法において発現する口内炎の予防および治療 口腔内の疼痛緩和:1回50mL 朝昼夕食後 10時 15時 眠前の1日6回 口腔内うがい

**C 滅菌外用剤****滅菌エコーゼリー**

1個 20g  
オーダ:(処伝)  
適応症・用法・用量  
甲状腺細胞診断の穿刺時に使用  
貯法:冷所

**エビネフリン液0.03%**

エビネフリン  
1本 50mL  
1mL中 300μg

オーダ:(処伝)

適応症・用法・用量

手術中における出血部位の止血:適量をガーゼに染み込ませ 出血部位にあてる

貯法:冷所・遮光

**滅菌ビオクタニン液1%**

塩化メチルロザニリン  
1本 1mL  
1mL中 10mg

オーダ:(処伝)

適応症・用法・用量

手術時のマーカーに使用

貯法:冷所・遮光

**D 点眼剤****塩化ナトリウム点眼液5%(高張点眼液)**

塩化ナトリウム  
1本 5mL  
1mL中 50mg  
オーダ:(院内)(エンカナトリウムテンガンエキ)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

角膜浮腫:1回1滴 1日1~6回点眼

貯法:冷所

**シクロスポリン点眼液0.05%【特殊製剤】**

シクロスポリンA  
1本 5mL  
1mL中 0.5mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

全層角膜移植後の拒絶反応の抑制:1回1滴 1日4~6回点眼

貯法:冷所

**自己血清点眼液20%【特殊製剤】**

1本 5mL  
1mL中 自己血清0.2mL

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

シェーグレン症候群(重度ドライアイの治療):1回1滴 1日数回点眼

貯法:冷所

## 院内製剤

### 自己血清点眼液50%【特殊製剤】

1本 5mL

1mL中 自己血清0.5mL

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

角膜潰瘍:1回1滴 1日数回点眼

貯法:冷所

### シフルカン点眼液0.2%【特殊製剤】

フルコナゾール

1本 5mL

1mL中 2mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

角膜真菌症:1回1滴 1日4～6回点眼

貯法:冷所

### クロルヘキシジン点眼液【特殊製剤】

グルコン酸クロルヘキシジン

1本 5mL

1mL中 0.2mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

角膜真菌症(アカントアメーバ角膜炎):1回1滴、1日数回点眼

貯法:冷所

### 生食点眼液(人工涙液)

塩化ナトリウム

1本 5mL

1mL中 9mg

オーダ:(院内)(セイシヨクテンガン)

適応症・用法・用量

角膜乾燥症 涙液減少症:1回1滴 1日1～6回点眼 適宜増減

貯法:冷所

### フロリードF点眼液0.1%【特殊製剤】

ミコナゾール

1本 5mL

1mL中 1mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

角膜真菌症:1回1滴 1日4～6回点眼

貯法:冷所

### マイトマイシン点眼液0.04%【特殊製剤】

マイトマイシンC

1本 5mL

1mL中 0.4mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

結膜乳頭腫術後の再発予防:1回1滴 1日数回点眼

貯法:冷所

### 硫酸アトロピン点眼液0.5%

硫酸アトロピン

1本 5mL

1mL中 5mg

オーダ:(院内)(アトロピンテンガン)

適応症・用法・用量

弱視 斜視:乳幼児に対して 1回1滴 1日2～3回点眼 検査前期間限定

投与

貯法:冷所

## E 点耳剤

### 耳垢水

炭酸水素ナトリウム グリセリン

1本 5mL

1本 50mL

1mL中 炭酸水素ナトリウム 50mg グリセリン 0.25mL

オーダ(5mL):(院内)(ジコウスイ)

オーダ(50mL):(処伝)

適応症・用法・用量

耳垢栓塞の軟化:

5mL;1日数回 適量を点耳

50mL;外来処置時に適量を塗布

### ブロー氏液【特殊製剤】

酢酸アルミニウム

1本 5mL

1本 20mL

アルミニウムとして1.8%

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

外耳および中耳の化膿性炎症、肉芽性鼓膜炎:

5mL;1日数回 適量を点耳

20mL;外来処置時に適量を塗布

## F 点鼻剤

### トーク点鼻

塩酸トラマゾリン

1本 10mL

1mL中 118mg

オーダ:(院内)(トークテンビエキ)

適応症・用法・用量

鼻出血 血管収縮:1回1噴霧 1日数回鼻腔内に噴霧

## G 坐剤

### チラーゼンS坐薬【特殊製剤】

レボチロキシナトリウム

1個中 150μg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

経口投与不可患者への甲状腺ホルモン補充:1日1回 1回150μgを直腸内に挿入 症状により適宜増減

貯法:冷所

### プロゲステロン腔坐薬 - W

プロゲステロン

1個中 200mg

オーダ:(院内)(プロゲステロン)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

体外受精における黄体ホルモン補充:1回1個 1日1～3回腔深部に挿入, 1日2回;朝・眠前 1日3回;朝・昼・眠前

貯法:冷所

## H 膀胱注入剤

### オキシブチニン液

オキシブチニン

1本 10mL

10mL中 5mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

難治性尿失禁:1回5mg(10mL) 1日1～2回 尿道カテーテルを用いて膀胱内に注入

貯法:冷所・遮光

## I 散剤

### サリチル酸亜鉛華デンブン末

サリチル酸 亜鉛華デンブン

1g中 サリチル酸 500mg 亜鉛華デンブン 500mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

へその緒の消褪:1日1～2回 適量を患部に散布

## 3 検査・診断薬

### 6規定塩酸液

塩酸

(医薬用外劇物)1本 30mL

オーダ:(処伝)

適応症・用法・用量

尿検査による蓄尿時の酸性維持

### 酢酸液4%

酢酸

1mL中 40mg

オーダ:(処伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

子宮粘膜炎を腐食し 子宮頸癌の診断:適量を粘膜に散布

### CMC - Na - イオバミロン気管支造影剤(滅菌)

#### 【特殊製剤】

イオバミドール

1シリンジ 5mL

5mL中 イオバミロン370 35mL

4%カルボキシメチルセルロースナトリウム 15mL

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

気管支狭窄 気管支分岐異常の診断

### 染色用ルゴール液1.2%

ヨウ素

1本 100mL

1mL中 I<sub>2</sub> 12mg ,KI 18.4mg (合計 30.4mg)

オーダ:(処伝)

適応症・用法・用量

食道癌染色(色素内視鏡検査)

貯法:室温・遮光

## 院内製剤

### トルイジンプルー液1%(滅菌)

トルイジンプルー

1本 20mL

1mL中 10mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

食道癌染色(色素内視鏡検査)

### パテントブルー液2%(滅菌)

パテントブルーV

1アンプル 2mL

2mL中 40mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

【本製剤使用開始時に同意取得が必要です】

センチネルリンパ節の同定:腫瘍の周囲に1~1.5cm離して0.2mLづつ5カ所に皮内注入

貯法:冷所・遮光

## 4 注射剤

### 亜硝酸ナトリウム注射液3%

亜硝酸ナトリウム

1アンプル 10mL

1mL中 30mg

オーダ:(製伝)

適応症・用法・用量

ニトプロ(ニトロプルシドナトリウム)注射液の過量投与時の解毒

貯法:冷所・遮光

### BCS注射液

塩化カリウム

BCS-1 1袋 530mL

5%ブドウ糖液 400mL

生理食塩液 100mL

KCL注10meqキット「テルモ」 30mL

BCS-2 1袋 1030mL

5%ブドウ糖液 800mL

生理食塩液 200mL

KCL注10meqキット「テルモ」 30mL

オーダ:(処伝)

適応症・用法・用量

心臓手術時の心停止および心筋保護:10~15mL/kgを冠動脈に投与

貯法:冷所・遮光

### ヘパソリタ注射液

ヘパソリタ

1本 500.5mL

ソリタT3 500mL

ヘパソリタ 0.5mL(500単位)

オーダ:(院内)(ヘパソリタ)

適応症・用法・用量

小児における高カロリー輸液施行中の血栓予防および化学療法後のハイドレーション:凝固系検査および尿量等を考慮した流速で点滴静注  
貯法:冷所

## 5 麻薬注射剤

### 硬膜外PCA625

クエン酸フェンタニル 塩酸ロピバカイン ドロペリドール

1袋 625mL中

フェンタニル注射液(0.25mg/5mL) 50mL

アナペイン注(150mg/20mL) 50mL

ドロレプタン注射液(25mg/10mL) 5mL

生理食塩液20mL 20mL

生理食塩液500mL 500mL

オーダ:(麻伝)

適応症・用法・用量

術後疼痛の緩和:術後,PCAポンプを介して硬膜外カテーテルより注入

貯法:冷所

### 静注用PCA250

クエン酸フェンタニル 塩酸ケタミン,ドロペリドール,リドカイン

1袋 250mL中

フェンタニル注射液(0.25mg/5mL) 25mL

ケタラール静注用(200mg/20mL) 20mL

ドロレプタン注射液(25mg/10mL) 5mL

オリベス点滴用(2000mg/200mL) 200mL

オーダ:(麻伝)

適応症・用法・用量

術後疼痛の緩和:術後,PCAポンプを介して静脈内に注入

貯法:冷所