

2020年2月5日

各 位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 1 2 4 7

プロスタグランジンE₁製剤のオーダ区分変更について

プロスタグランジン E₁ 製剤「アピスタンディン注射用 20 μ g、500 μ g」（日本ケミファ株式会社）は、販売名称が一般名である『アルプロスタジル アルファデクス注射用 20 μ g「F」』『アルプロスタジル アルファデクス点滴静注用 500 μ g「F」』（富士製薬工業株式会社）へ変更となりました。当院にはすでに、「アルプロスタジル注 5 μ g」（沢井製薬株式会社）、「アルプロスタジル注 10 μ g シリンジ」（東和薬品株式会社）の 2 規格が採用となっており、オーダ間違いや払い出し間違いを防ぐために、**2020年2月6日（木）より以下の通り使用を限定します。**

- ・「**アルプロスタジル注 5 μ g**」：放射線部限定
- ・「**アルプロスタジル アルファデクス点滴静注用 500 μ g「F」**」：手術室、救急科限定

2020年2月6日（木）より、オーダ名を『アルプロスタジルアルファデクス注射用 20 μ g「F」』、『アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用 500 μ g「F」』へ変更します。なお、変更は名称のみですが、**製品により適応症が異なるため、オーダする際は注意して下さい。**新名称品の払い出しは、旧名称品の薬剤部の在庫がなくなり次第の開始となりますが、**オーダ名と異なる場合がありますのでご注意下さい。**

名称	成分名	規格	区分
アルプロスタジル注 5 μ g「サワイ」	アルプロスタジル	5 μ g/1mL/アンプル	注射 放射線部限定
アルプロスタジル注 10 μ g シリンジ「トーワ」		10 μ g/2mL/シリンジ	注射
アルプロスタジル アルファデクス注射用 20 μ g「F」 (旧オーダ名：アピスタンディン注射用20 μ g)	アルプロスタジル アルファデクス	20 μ g/バイアル	注射
アルプロスタジル アルファデクス点滴静注用 500 μ g「F」 (旧オーダ名：アピスタンディン注射用500 μ g)		500 μ g/バイアル	注射 手術室、救急科 限定

* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。

<別紙>

名称	適応症	区分
アルプロスタジル注 5μg 「サワイ」	<ul style="list-style-type: none"> 慢性動脈閉塞症（バージャー病、閉塞性動脈硬化症）における四肢潰瘍ならびに安静時疼痛の改善 進行性全身性硬化症、全身性エリテマトーデスにおける皮膚潰瘍の改善 	注射 放射線部 限定
アルプロスタジル注 10μg シリンジ 「トーワ」	<ul style="list-style-type: none"> 糖尿病における皮膚潰瘍の改善 振動病における末梢血行障害に伴う自覚症状の改善ならびに末梢循環・神経・運動機能障害の回復 動脈管依存性先天性心疾患における動脈間の開存 経上腸間膜動脈性門脈造影における造影能の改善 	注射
アルプロスタジル アルファデクス 注射用 20μg 「F」 (旧オーダ名： アピスタンディン 注射用20 μ g)	<p><動脈内投与></p> <ul style="list-style-type: none"> 慢性動脈閉塞症（バージャー病、閉塞性動脈硬化症）における四肢潰瘍ならびに安静時疼痛の改善 <p><静脈内投与></p> <ol style="list-style-type: none"> 振動病における末梢血行障害に伴う自覚症状の改善ならびに末梢循環・神経・運動機能障害の回復 血行再建術後の血流維持 動脈内投与が不適と判断される慢性動脈閉塞症（バージャー病、閉塞性動脈硬化症）における四肢潰瘍ならびに安静時疼痛の改善 動脈管依存性先天性心疾患における動脈管の開存 <p><陰茎海綿体内投与></p> <ul style="list-style-type: none"> 勃起障害の診断 	注射
アルプロスタジル アルファデクス 点滴静注用 500μg 「F」 (旧オーダ名： アピスタンディン 注射用500 μ g)	<ul style="list-style-type: none"> 高血圧症または軽度の虚血性心疾患を合併する場合における外科手術時の低血圧維持 外科手術時の異常高血圧の救急処置 	注射 手術室と 救急科 限定