

2020年8月26日

各 位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 1 3 1 9

「エスポー注射液750シリンジ」の販売中止について

エポエチン アルファ製剤「エスポー注射液 750 シリンジ」（協和キリン株式会社）は販売中止となりました。

当院では、**2020年8月27日（木）より「エスポー注射液750シリンジ」の取扱いを中止し、『エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」』（キッセイ薬品工業株式会社）のオーダーを開始します。**

	オーダー開始	オーダー中止
オーダー名	エポエチンアルファ BS 注 750 シリンジ「JCR」	エスポー注射液 750 シリンジ
成分名	エポエチン カップ（遺伝子組換え） [エスポー注射液 後続1 製剤]	エポエチン アルファ（遺伝子組換え）
規格	750 国際単位／0.5mL／シリンジ	
適応症・ 用法用量	・透析施行中の腎性貧血： 投与初期：[成人] 1回 3000 国際単位を週3回、できるだけ緩徐に静脈内投与 維持量：[成人] 貧血改善効果が得られたら、1回 1500 国際単位を週2～3回、 あるいは1回 3000 国際単位を週2回投与 貧血改善効果の目標値はヘモグロビン濃度で10 g/dL（ヘマトクリット値で30%）前後とする いずれの場合も貧血症状の程度、年齢等により適宜増減するが、維持量での最高投与量は、 1回 3000 国際単位、週3回投与とする ・未熟児貧血： 1回 200 国際単位/kg を週2回皮下投与 ただし、未熟児早期貧血期を脱し、ヘモグロビン濃度が10 g/dL（ヘマトクリット値で30%） 前後で臨床症状が安定したと考えられる場合は投与を中止すること なお、貧血症状の程度により適宜増減する	
外観写真		
区分	注射 2020年8月27日（木）より オーダー開始	注射 2020年8月27日（木）より 当院取り扱い中止

* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。